



GENEL KİMYA



7. Konu....

Gazlar



Gaz halindeki elementler

25°C ve 1 atmosfer de gaz halinde bulunan elementler

1A																8A	
H												3A	4A	5A	6A	7A	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
		3B	4B	5B	6B	7B	8B		1B		2B						
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg							

Gaz halindeki element ve bileşikler

TABLE 5.1 Some Substances Found as Gases at 1 atm and 25°C

Elements	Compounds
H ₂ (molecular hydrogen)	HF (hydrogen fluoride)
N ₂ (molecular nitrogen)	HCl (hydrogen chloride)
O ₂ (molecular oxygen)	HBr (hydrogen bromide)
O ₃ (ozone)	HI (hydrogen iodide)
F ₂ (molecular fluorine)	CO (carbon monoxide)
Cl ₂ (molecular chlorine)	CO ₂ (carbon dioxide)
He (helium)	NH ₃ (ammonia)
Ne (neon)	NO (nitric oxide)
Ar (argon)	NO ₂ (nitrogen dioxide)
Kr (krypton)	N ₂ O (nitrous oxide)
Xe (xenon)	SO ₂ (sulfur dioxide)
Rn (radon)	H ₂ S (hydrogen sulfide)
	HCN (hydrogen cyanide)*

*The boiling point of HCN is 26°C, but it is close enough to qualify as a gas at ordinary atmospheric conditions.

Gazların Genel Özellikleri

- Gazlar, bulundukları kabın şeklini alacak şekilde genişirler.
- Renkli gazları gözle görebilsek de, gaz taneciklerini gözle göremeyiz.
- Hidrojen ve metan gibi bazı gazlar yanıcıdır; diğer taraftan helyum ve neon gibi bazı gazlar kimyasal tepkimeye duyarlıdır.
- Maddenin en fazla sıkıştırılabilen halidir.

Gazların Genel Özellikleri

- Gazların fiziksel özelliklerini mol sayıları, hacimleri, sıcaklıkları ve basınçları belirler.
- Gazlar aynı kapta bulundukları diğer gazlar ile her oranda tamamen karışır.
- Yoğunlukları sıvılardan da katılardan da düşüktür.

Gazların Genel Özellikleri

Üç halojenin gaz hali

$\text{Cl}_{2(g)}$ yeşilimsi sarı;

$\text{Br}_{2(g)}$ kahverengimsi kırmızı;
grimsi siyah katı iyot ile temas halindeki $\text{I}_{2(g)}$ mor renklidir.



- H_2 , N_2 , O_2 , CO ve CO_2 gibi birçok bilinen gaz renksizdir.

Basınç Kavramı

- Basınç, birim alana düşen kuvvettir.


$$\text{Basınç} = \frac{\text{Kuvvet (Newton)}}{\text{Alan (m}^2\text{)}}$$

Basınç Birimleri

$$1 \text{ paskal (Pa)} = 1 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ atm} = 76 \text{ cmHg} = 760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr}$$

$$1 \text{ atm} = 101,325 \text{ Pa}$$




Sıvı Basıncı

- Gaz moleküllerinin oluşturduğu toplam kuvvetin ölçülmesinin kolay olmaması nedeniyle basınç denkleminin gazlara uygulanması zordur.
- Bir gazın basıncı dolaylı yoldan sıvı basıncıyla kıyaslanarak ölçülür.

$$\text{Sıvı basıncı} = h \times d \times g$$


Açık hava basıncının ölçülmesi

- 1643 yılında Toricelli'nin açık hava basıncını ölçmek amacıyla geliştirdiği civalı düzeneğe **BAROMETRE** denilmiştir.
- **Barometre:** açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet




Açık hava basıncı-Yükseklik İlişkisi

Deniz seviyesinden yüksekliğe doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır.




Gaz Basıncı

Gazlar bulundukları kabın her noktasına basınç uygularlar.



(a)




(b)


Manometre

- Civa barometreleri hava basıncını ölçmek için kullanılırken manometreler de diğer gazların basıncını ölçmek için kullanılırlar.
- **Manometre:** kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçmeye yarayan alet.
- İki çeşittir.
- a) Kapalı uçlu manometre
- b) Açık uçlu manometre

Kapalı uçlu manometre




Boşluk



$$P_{\text{Ne}} = 65\text{mmHg}$$

Açık uçlu manometre




Açık uçlu manometre ile gaz basıncının ölçülmesi

- Açık uçlu manometrede üç farklı durum ile karşılaşmak mümkündür.
- Gaz basıncının ile atmosfer basıncının birbirine eşit olması
- Gazın basıncının atmosferik basınçtan büyük olması
- Gazın basıncının atmosferik basınçtan küçük olması


Açık uçlu manometre ile gaz basıncının ölçülmesi

Gaz Basıncı
Atmosferik
Basınca
Eşittir



$$P_{\text{gaz}} = P_{\text{atm}}$$


Açık uçlu manometre ile gaz basıncının ölçülmesi



Gaz
Basıncı
Atmosferik
Basıncıdan
Küçüktür

(a)

$$P_{\text{gaz}} = P_{\text{atm}} - \Delta h$$




Gaz
Basıncı
Atmosferik
Basıncıdan
Büyüktür


(b)

$$P_{\text{gaz}} = P_{\text{atm}} + \Delta h$$


Gazın basıncı nedir?




Gazın basıncı nedir?




Gazın basıncı nedir?



Gazın basıncı nedir?



Gazın basıncı nedir?



Gaz Kanunları

- Gazların fiziksel davranışlarını dört özellik belirler:
- **gaz miktarı,**
- **hacmi,**
- **sıcaklık**
- **basınç.**

Gaz Kanunları

Basınç-hacim İlişkisi: BOYLE KANUNU

Sabit sıcaklıkta belirli miktardaki bir gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır.

$$V \propto 1/P$$

$$P \times V = \text{sabit}$$

Gaz Kanunları

Sıcaklık-hacim ilişkisi: CHARLES ve GAY-LUSSAC KANUNU

Sabit basınçta, belirli miktar bir gazın hacmi gazın **mutlak sıcaklığı** ile doğru orantılıdır.

$$T \text{ (K)} = t \text{ (}^{\circ}\text{C)} + 273.15$$

Kuramsal bir gazın hacminin sıfır olduğu sıcaklığa mutlak sıfır sıcaklığı denir. Bu sıcaklık -273.15°C ve 0 Kelvin'dir.

Gaz Kanunları

$$V \propto T$$

$$V_1/T_1 = V_2/T_2$$

Sabit hacimde, belirli miktar bir gazın basıncı gazın mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır.

$$P_1/T_1 = P_2/T_2$$

Gaz Kanunları

Hacim-mol Sayısı İlişkisi: AVOGADRO KANUNU

$$V \propto \text{mol sayısı } (n)$$

Sabit sıcaklık ve basınçta bir gazın hacmi ile mol sayısı doğru orantılıdır.

Gaz Kanunlarına Toplu Bakış

Boyle Kanunu: $P \propto \frac{1}{V}$ (n ve T sabit)

Charles Kanunu: $V \propto T$ (n ve P sabit)

Avogadro Kanunu: $V \propto n$ (P and T)

$$V \propto \frac{nT}{P}$$

Gaz Kanunlarına Toplu Bakış

Gaz kanunlarındaki bu orantılar
birleştirildiğinde tek bir formül elde edilir...

İdeal Gaz Denklemi

$$P V = n R T$$


- **P** basınç, birimi atmosfer
- **V** hacim, birimi Litre
- **n** miktar, birimi mol
- **R** gaz sabiti ve değeri 0.0821 atm•L/mol•K yada 22.4/273
- **T** sıcaklık, birimi Kelvin.

Standart(Normal) Basınç ve Sıcaklık

$$P = 1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg}$$

$$T = 0^{\circ}\text{C} = 273.15 \text{ K}$$

Deneyler bu koşullarda 1 mol ideal gazın 22,414 L hacim kapladığını göstermiştir.



Standart(Normal) Basınç ve Sıcaklık

$$PV = nRT$$

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{(1 \text{ atm})(22,414\text{L})}{(1 \text{ mol})(273,15 \text{ K})}$$

$$R = 0,082057 \text{ L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})$$

ya da $22,4/273 \text{ L} \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})$

Örnek: Standart koşullarda 49,8 g HCl (g) nın hacmini L cinsinden hesaplayınız. (HCl:36.5 g/mol)

$$T = 0^{\circ}\text{C} = 273 \text{ K}$$

$$P = 1 \text{ atm}$$

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{P}$$


$$n = \frac{49.8 \text{ g}}{36.5 \text{ g HCl}} = 1.37 \text{ mol}$$

$$V = \frac{1,37 \text{ mol} \times 0,0821 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \times 273 \text{ K}}{1 \text{ atm}}$$

$$V = 30,7 \text{ L}$$

Soru. STP'de (normal şartlar altında) 56 g CH_4 gazı ne kadar hacme sahiptir ? ($M_{\text{CH}_4}=16 \text{ g/mol}$)

Soru. 250 mL'lik bir balonda 3.40 g NH_3 127 °C sıcaklıkta patlayıncaya kadar ısıtılıyor. Patlamadan hemen önce balondaki basınç ne kadardır ? ($M_{\text{NH}_3}=17 \text{ g/mol}$)




Açık hava basıncının 76 cmHg olduğu bir yerde X ve Y gazları kullanılarak şekildeki sistem hazırlanıyor.

Bu sistemde X gazının basıncı kaç cmHg dir?

- A) 40 B) 64 C) 88 D) 100 E) 112






fizikciyiz.com



X ve Y gazları ile dolu balonlar ve üç manometre, şekil-
deki gibi birbirine bağlıdır.

Açık hava basıncının 70 cm Hg olduğu ortamda 1, 2 ve
3 nolu manometrelerdeki Hg düzeyleri şekildeki gibidir.


M musluğu açılıp yeterince beklendiğinde, 3 nolu
manometredeki Hg düzeyi aşağıdaki şekillerden
hangisindeki gibi olur?



60 cm³ lük bir kapta –73°C deki X gazı 0,2 atm basınç yapmaktadır.

Sıcaklık 27°C ye çıkarılıp gaz 75 cm³ lük kaba aktarıldığında kaç atm basınç yapar?

- A) 0,24 B) 1,2 C) 2,4 D) 12 E) 24



Şekildeki manometreli sistemde 1. koldaki cıva seviyesi farkı (h) kaç mm dir?

- A) 75 B) 100 C) 500 D) 750 E) 1000

6.8)

- a) NŞA kısaltması hangi şartları gösterir?
- b) İdeal bir gazın NŞA'daki molar hacmi nedir?
- c) Oda sıcaklığı genellikle 25°C kabul edilir. 25°C'de ve 1 atm basınçta ideal bir gazın molar hacmi nedir?

6.11) Aşağıdaki tablodaki boş yerleri ideal bir gaz için doldurun.

P	V	n	T
2 atm	1 L	0,500 mol	? K
0,300 atm	0,250 L	? mol	27°C
650 torr	? L	0,333 mol	350 K
? atm	585 mL	0,250 mol	295 K

İdeal X, Y ve Z gazlarının basınç, hacim ve mol sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Gaz	Basınç	Hacim	Mol sayısı
X	P	V/2	2n
Y	P/8	V	4n
Z	P/4	2V	6n

Buna göre, gazların mutlak sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki vardır?

- A) $T_X > T_Y > T_Z$ B) $T_Y > T_X > T_Z$ C) $T_X > T_Z > T_Y$
D) $T_X > T_Y > T_Z$ E) $T_Z > T_Y > T_X$